











MUSEUM  
CARLSONIANUM.





# MUSEUM CARLSONIANUM,

In quo

*Novas et Selectas Aves,*

*Coloribus ad vivum brevique descriptione illustratas,*

*Suasu et sumtibus Generosissimi Possessoris;*

Exhibet

ANDREAS SPARRMAN,

M. D. et Profess. Reg. Acad. Scient. Stockholmenf. Musei Praefect. Ejusd. Acad. ut et  
Societ. Physiograph. Lund. Scient. ac Litt. Gothoburg. Hess. Homburg. Membr.



FASCICULUS II.



HOLMIAE,

Ex Typographia Regia, MDCCLXXXVII.





71  
72  
76  
50.2  
CHRB

## Elenchus Avium Fasciculi II.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| N:o XXVI. <i>FALCO dubius.</i>    | XXXIX. <i>ANAS spectabilis</i> , Mas.       |
| XXVII. <i>PSITTACUS cyaneus.</i>  | XL. — — — Femina.                           |
| XXVIII. — <i>Novae Zelandiae.</i> | XLI. <i>LOXIA Cardinalis</i> ,<br>varietas. |
| XXIX. — <i>Vernalis.</i>          | XLII. <i>EMBERIZA cyanella</i> ,<br>Mas.    |
| XXX. — <i>bimaculatus.</i>        |   |
| XXXI. <i>ORIOIUS melaleucus.</i>  | XLIII. — — — Femina.                        |
| XXXII. <i>CUCULUS taitensis.</i>  | XLIV. — — — <i>ruticapilla.</i>             |
| XXXIII. <i>SITTA Chloris.</i>     | XLV. <i>TANAGRA capensis.</i>               |
| XXXIV. <i>CERTHIA undulata.</i>   | XLVI. <i>MUSCICAPA bicolor.</i>             |
| XXXV. — — — <i>lepida.</i>        | XLVII. — — — <i>fuliginosa.</i>             |
| XXXVI. — — — <i>armillata.</i>    | XLVIII. <i>PARUS peregrinus</i> ,<br>Mas.   |
| XXXVII. <i>ANAS magellanica.</i>  | XLIX. — — — Femina.                         |
| XXXVIII. — <i>fraenata.</i>       | L. — — — <i>indicus.</i>                    |
-







*Falco dubius.*



N:o XXVI.

*FALCO dubius*: corporis totius plumis ad  
exortum albis, macula subalari magna, albida.

*Rostrum* nigricans.

*Cera* secundum aetatem a flavo ad obscurum variat,  
ut in aliquot Falconis speciebus non semel  
compertum est.

*Iris* Lutea.

*Pedes* crocei.

*Caput*, *Colli* *Dorsum*, *Tectrices Alarum* cinereo-fuscae,  
*Plumarum singularum* extrema margine f. acie fer-  
ruginea.

*Interscapulum*, *Ipsumque Dorsum*, saturatius fusca.

*Gula*, *Jugulum*, *Pectus*, ferruginea, plumarum rachi-  
dibus nigris.

*Cauda* superne cinerea, apice nigricans, versus basin  
fasciis tribus fuscis notata.

—— subtus cinereo-albicans, apice fusca, pennis  
fascia una alterave notatis.

Obs. Hanc speciem, quae in Svecia passim, sed non frequen-  
ter occurrit, et pro Gyrfalconisvari etate haud merito a non-  
nullis suspecta est, *F. dubium* appellavimus.

01





*Psittacus cyaneus.*



N:o XXVII.

*PSITTACUS cyaneus* : corpore toto  
*saturate et splendide Coeruleo.*


*Rostrum* pallidum , apice fuscum.

*Pedes* nigri.

*Corpus totum* ex cyaneo nitens.

Obs. Habitat in Infula Taiti f. Otaheiti. In hac quoque Cythera Maris Pacifici , ejusdem Psittaci varietatem pectore albo, illustrissimo Buffonio Taitensis dictam , (confr. *Planches enl.* 455. *fig.* 2.) soepe vidimus eaque Museum Carlsonianum ditavimus. Colorem autem cyaneum in utraque varietate eundem et hinc l. c. nimis dilutum esse monendum est.





*Psittacus Novae Zelandiae.*





N:o XXVIII.

*PSITTACUS Novae Zelandiae: viridis, sincipite, macula sub-oculari et Hypochondriis coccineis.*

*Rostrum nigrum.*

*Frons, Sinciput, Macula utrinque sub-ocularis coccinea.*

*Occiput, Colli dorsum, Dorsum ipsum, Tectrices Alarum, Uropygium Caudaeque pagina superior prafina.*

*Jugulum, Pectus, Abdomen, Femora laete viridia.*

*Hypochondria maculis coccineis notata.*


*Alae et Cauda subtus fuscae.*

*Remigum Quinque Primariae fuscae, Disco anteriore superius dilatato et caerulescente.*

*Pedes nigri.*

**OBS.** Duarum specierum hujus Generis, quae in Nova Zelandia occurrunt, haec circiter dupplo minor erat.





*Psittacus vernalis.*



N:o XXIX.

*PSITTACUS vernalis* : lacte viridis,  
alis prasinis, uropygio caudaeque pagina supe-  
riore sanguineis, rostro pedibusque pallidis.

*Rostrum* rubicundum.

*Pedes* pallidi.

*Tectrices Alarum* saturatissime virides.

*Remiges* prasinæ.

*Uropygium* sanguineum.


*Cauda superius* sanguinea.

—— *inferius* caerulea.

*Reliqua Corporis* pallide viridia.







*Psittacus bimaculatus.*



N:o XXX.

*PSITTACUS bimaculatus* : maculis  
colli duabus oblongis , nigris , utriusque alae  
macula magna et sulphurea.

*Rostrum* sub - fanguineum.

*Frons* , *Gula* , *Jugulum* , *Latera Capitis* Collique sub-  
aurantia.

*Gula* et *Jugulum* a rostro ad initium pectoris *Macula*  
*Magna Ovali Nigra* ex congerie macularum mino-  
rum utrinque notantur.

*Nucha* , *Dorsum Colli* , *Interscapulium* , *Dorsum Ipsum* , *Uro-*  
*pygium* *Caudaeque pagina superior* prafina.

*Pectus* , *Abdomen* , *Criſsum* laete viridia.

*Tectrices Anteriores Minores Remigum Primar.* prafinae.

———— *Inferiores Majores Remigum Secundariorum* et  
*Remiges Posticae Minores glaucae* , margine sulphureae.

*Remigum Extima* tota nigra.

———— *Reliquae Rachide nigrae* , *Disco exteriori* viri-  
des , *Ultimo margine* leviter flavicantes , *Disco in-*  
*teriori* fuscae ac *Ipsa Acie* sulphureo flavicantes.

*Pedes* fusco - cinerei.

*Cauda* subtus pallida.





*Oriolus melaleucus.*



N:o XXXI.

*ORIO LUS melaleucus* : *niger* , *Alarum*  
*macula alba.*

*Rostrum* supra nigrum, infra fuscum.

*Caput* , *Collum* *Dorsumque* ex nigro nitentia.

*Tectrices supra - et sub - alares minores* albae.

—— *Reliquae* fuliginosae.

*Remiges* circiter viginti fuliginosae.


*Pedes* nigricantes.

*Cauda* rotundata Duodecim Rectricibus.

Obs. E Surinam pro ornando Museo Carlsoniano , Melaleuci  
nostri specimen missum est.







*Cuculus taitensis*



N:o XXXII.

*CUCULUS taitensis*: *supra fuscus alboque punctatus, subtus laete ferrugineus ac lineolis brevibus longitudinaliter nigro striatus, cauda fusca maculis albidis sublunatis fasciata.*

*Rostrum* fusco flavicans.

*Pedes* nigri.

*Capitulum totum* nigricans, maculis oblongis testaceis ex rachidibus plumarum ejusdem coloris, notatum.

*Colli latera, Dorsum Colli ac Interscapulum* fusca maculisque oblongis albidis adspersa.

*Alae, Dorsum, Uropygium* maculis s. punctis majoribus albidis notata.

*Gula, Jugulum, Pectus, Abdomen, Crissum, Femora,* laete ferruginea, lineolis s. striis nigris longitudinalibus notata.

*Rectrices* fusco-nigrae, rachidibus brunneis, maculis untrunque ad discum sub-lunatis albidis fasciatae.





*Sitta cloris*.



N:o XXXIII.

*SITTA Chloris*: corpore supra viridi, subtus candido, cauda atra, ultimo apice flavicante.

*Rostrum* porrectum capite longius, subtus versus apicem nigricans.

*Caput*, *Dorsum Colli*, *Interscapulium Dorsumque* viridia.

*Gula*, *Jugulum*, *Pectus*, *Abdomen Crissumque* alba.

*Remiges* fuscae, *Margine* exteriori virescentes, transversaliter in Medietate flavicantes, hinc *Fascia* alarum transversalis tenuis flavescens.

*Tectrices Alarum superiores* f. minores virescenti-fuscae.

———— Inferiores anteriores, ac Superiores anteriores in angulo ad flexuram candidae.


*Uropygium* flavicans.

*Cauda* brevis, *Rectricibus* atris, extremo apice flavicantibus.

OBS. In Provincia Promontorii Bonae Spei, AKTER BRUNTIES HOOGTENS dicta, hanc speciem detegimus.







*Certhia undulata.*



N:o XXXIV.

*CERTHIA undulata* : *supra cinereo-fuliginosa, subtus alba nigroque transversim undulata.*

*Rostrum* arcuatum, subtrigonum, fuscum.

*Capitium, Lateralia Capitis, Dorsum Colli, Dorsum Ipsum, Alae Caudaeque pagina superior* cinereo-fuliginosa.


*Gula, Jugulum, Pectus, Abdomen, Femora ac Crurum* alba, lineis tenuibus transversis nigris undulatis fasciata.

*Remiges* fuliginosae, marginibus cinereo-olivaceis.

*Pedes* nigri.

*Caudae pagina inferior* cinerea.





*Certhia lepidus.*



N:o XXXV.

*CERTHIA lepida*: *subtus flava, pileo ex viridi nitente, collo et interscapulio hepaticis, uropygio splendide violaceo, alis, cauda pedibusque fuscis.*

*Rostrum* arcuatum, subtriquetrum, nigrum.

*Capitulum* viride nitens.

*Capitis latera, Collum, Interscapulum* intense hepatica.

*Rectricum Alarum Una Alterave supremarum ad angulum alae* interdum ex viridi nitent.

————— *Reliquae hepaticae.*

*Remiges* Fusco - Brunnei.

*Dorsi Pars Posterior et Uropygium* ex violaceo nitentia.

*Pectus, Abdomen, Crissum, Femora* citrina.

*Pedes* nigri.


*Cauda nigra, Rectricibus* flavis.







*Certhia Armilata.*



N:o XXXVI.

*CERTHIA armillata* : *viridis* , *alis complicatis supra nigris* , *subtus luteis* , *humeris* , *femorum armillis maculisque aliquot uropygii saphirinis*.

*Rostrum* arcuatum nigrum.

*Capitulum* , *Dorsum Colli* , *Dorsum Ipsum* smaragdino-viridia.

*Gula* , *Jugulum* , *Pectus* , *Tempora* , *Abdomen* , *Hypochondria* albido-virentia.

*Criſsum* flavicans.


*Alae Complicatae supra atrae* , angulo exteriori f. humeris macula obliqua ex caeruleo - saphirino nitenti notatae , *subtus luteae* , margine exteriori et apice nigrae.


*Remiges* circiter viginti , marginibus exterioribus et apicibus nigris , marginibus autem interioribus flavis , ita ut in pennis complicatis luteum ex nigredine , nigredo autem ex luteo cooperiatur.

*Pedes* flavicantes ungulis nigris.


*Cauda* Rectricibus Duodecim constans.

Obs. Habitat in Surinam. Interdum variat plumula una alterave regionis iliaci , pectoris , extimi criſſi ac temporum caeruleo-coelestibus. Taenia nigra a rostro per oculum ducta et hujus parti superiori contigua linea flava non raro variat.





*Unas magellanica.*



N:o XXXVII.

*ANAS magellanica*, *Femina*: *Speculo*  
*alarum viridi*, *abdomine*, *crisso*, *uropygio*,  
*femoribus caudaque albis*.

*Rostrum* cinereo-flavicans.

*Capillitium* cinereum.

*Latera Capitis*, *Gula* et *Colli pars superior* fusco-grisea,  
*Interscapulum*, *Dorsum*, *Uropygium* fusco-brunnea.

*Juguli*, *Pectoris*, et *Abdominis Plumae* nigrae, fasciis  
quatuor albis notatae.

*Remiges Primariae* nigrae.

———— *secundariae* albae.

*Tectrices supra alares anteriores* albae.

———— ————— *posteriores* ex viridi anatino tinctae  
speculum formant.

*Cauda Crissum* et *Femora* alba.

Obs. Mās totus est albus, rostro nigro pedibusque flavis ac  
Anseri domestico paulo minor; (cfr. celeberrimi Forsteri  
*Voyage round the world*. Vol. II. pag. 495. *Femina* autem  
*Anseri magellanico* Buffonii pl. enl. 1006. quodammodo  
similis, ab hoc in plurimis tamen differt.





*Anas fraenata*



N:o XXXVIII.

*ANAS fraenata*: fusco - ferruginea, speculo alarum, abdomine capitisque annulo ad rostri basin albis.

*Rostrum* nigrum latiusculum.

*Caput* brunneum, ad *Rostrum* basin *Habena* f. *Fascia* alba cinctum.

*Collum* ferrugineum.

*Interscapulum*, *Dorsum*, *Cauda* fusco - ferruginea.

*Humeri*, *Latera Pectoris* et *Hypochondria* punctis minutis albidis adspersa.

*Pectus* anterieus superius ex fusco alboque undulatum.

*Abdomen* anterieus albo - fericeum, posterius ex fusco fordide album.


*Remiges Primariae* Decem, nigrae.


—— *secundariae* albae, basi *Tectricibus* nigris coopertae; hinc speculum alarum parvum album.

*Pedes* nigri.

*Cauda* rotundata.

OBS. *Anatis fraenatae* specimen e Museo suo benigne communicavit Generosissimus ALSTRÖMER. Circa Alandiam occurrit et a venatoribus nonnullis pro *Anatis Marilae* femina habetur?





*Anas spectabilis*, Mas.



N:o XXXIX.

*ANAS spectabilis*, Mas : rostro basi gibbo  
compresso : carina pennacea nigra capite ca-  
nescente.

*Rostri* Gibbus flavus *Carina* pennacea nigra.

—— *ipsius* color ex rubicundo nigroque fuscus.

*Capitulum* ex plumbeo caerulescentique canum.

*Oculi* macula parva nigra cincti.

*Regio infra-ocularis* leniter virescens.

*Gulae Nigredo* versus nucham bifurcata extenditur.

*Jugulum* ac *Pectus* flavescenti-albida.

*Colli Dorsum*, *Humeri*, *Interscapulum* alba.

*Uropygium* nigrum, *Lateribus* album.

*Tectrices supra-alares anteriores inferiores* candidae hu-  
meros albos formant.

—— reliquae nigrae, earumque utriusque alae una  
erecta et cochleata.

*Remiges omnes* nigricantes.

—— secundariae antrorsum falcatae.


*Pedes* rubicundi.

*Cauda* brevis, fuliginosa.

Obs. Edvardi figura, a Linneo citata, naturae minus congrua.







*Anas spectabilis, Foemina.*



N:o XL.

*ANAS spectabilis*, *Femina*: ferrugineo-  
fusca nigroque maculata, regione oculorum alba,  
apicibus alarum caudaque cinereis.

*Rostrum* nigrum.

*Oculi* macula parva alba cincti.

*Caput* et *Collum* ferruginea.

*Pectus*, *Interscapulium*, *Dorsum*, *Uropygium* ferruginea  
nigroque maculata.

*Abdomen*, *Femora*, *Criſsum* ferrugineo-fuliginosa.

*Tectrices Omnes* cinereo fuscae.

—— *Posteriores majores* apicibus albis, unde linea  
transversalis alaris alba anterior formatur.


*Remiges Primariae* apice cinerae.

—— *ſecundariae* nigricantes, apicibus obscure al-  
bicantibus, hinc linea transversalis alaris albida  
posterior.

*Pedes* nigri.

*Cauda* cinerea.

Obs. Qui artem venatoriam in mari Balthico ad oras Suderman-  
niae exercent, hanc non nisi pro *Anatis spectabilis* Femina  
habent.





*Loxia Cardinalis*



## N:o XLI.

*LOXIA Cardinalis*, Varietas non cristata :  
*rubra*, mento nigro, uropygio, cauda, alis  
*pedibusque fuscis*.

*Rostrum* sub sanguineum.

*Capite* non cristato *Fronteque* minime nigra a varietate cristata praecipue differt.

*Menti* macula parva nigra differt a varietatis cristatae macula magna nigra quae mentum totamque gulam occupat.

*Pedibus*, *Alis*, *Caudaque* Varietati cristatae nec non *Loxiae mexicanae* Brissonii parum dissimilis, ab hac tamen magnitudine mentique nigredine praecipue differt.


Obs. Vivam ex Insulis Indiae occidentalis missam observavimus et ob habitum *Loxiae Cardinali* simillimum non nisi pro ejusdem pullo vel varietate habendam duximus.







*Emberitza cyanella*, Mas.



N:o XLII.

*EMBERIZA cyanella*, Mas: capite, collo, uropygio corporeque subtus caeruleo nitentibus; interscapulio humerisque ex caeruleo ferrugineoque variis, remigibus rectricibusque fuscis margine caerulefcentibus.

*Rostrum* pallide flavicans.


*Caput*, *Collum*, *Pectus*, *Abdomen*, *Femora*, *Crissum* et *Uropygium* cyanea.


*Interscapulii*, *Dorsi* *Tectricumque Plumae* cyanae, ferrugineis caeruleisve plumis margine apiceque rubiginosis mixtae.

*Remiges*, *Rectricesque* fuliginoso-fuscae marginibus caerulefcentibus.

*Pedes* flavicantes.

Obs. Habitat in America Septentrionali.





*Emberitza cyanella, Foemina.*



N:o XLIII.

*EMBERIZA cyanella*, Femina : corpore supra ex fusco, ferrugineo ac paululum caerulefcenti vario; subtus ferrugineo - albicante, maculis cyaneis notato; remigibus rectricibusque fuscis, margine caerulefcentibus.

*Rostrum* pallide flavicans.

*Capitulum*, *Dorsum Colli*, *Interfcapulium*, *Dorsum Ipsum* ferruginea, plumis aliquot caeruleis hinc illinc sparsis variegata.

*Gula* albicans cyaneo maculata.

*Jugulum*, *Humeri* et *Pectus* ferruginea, maculis cyaneis dense notata.

*Abdomen* albicans caeruleo maculatum.

*Criſſum* laete ferrugineum.

*Teſtrices Supra-Alares* ac *Caudae* in medio caeruleae, ambitu rubiginosae.


—— *Sub-Alares* ac *Hypochondria* laeniter-virefcentia.

*Remiges Rectricesque* fuscae margine cyanae.

*Pedes* flavicantes.







*Emberiza ruticapilla*



## N:o XLIV.

*EMBERIZA ruticapilla* : corpore supra  
fusco , subtus cinereo ; gula ferruginea , capistro  
albo , capilitio insuper rufescente , cauda nigra.

*Rostrum* fusco - brunneum.

*Capistrum* ex macula magna albida nigro punctata ,  
frontem et genas occupante.

*Vertex* et *Occiput* rubicunda , anterius et lateribus  
nigro marginata.

*Latera Colli* , *Interscapulum* , *Alae* ac *Dorsum* fordide  
fusca.

*Gula* ferruginea.

*Pectus* cinereo - ferrugineum.

*Abdomen* *Criussumque* cinerea.

*Pedes* fusco - brunnei.

*Cauda* fuliginoso - nigricans.





*Tanagra capensis.*



N:o XLV.

*TANAGRA capensis* : *supra ferrugineo-fusca, subtus ferrugineo alboque varia, cauda in medio nigricante lateribus ferrugineo-rufescente, rostro flavicante, pedibus nigris.*

*Rostrum* pallide flavicans.

*Frons* ferruginea.


*Vertex, Occiput, Latera et Dorsum Colli, Alae, Inter-*  
*scapulum ac Dorsum* ferrugineo-nigricantia.

*Gula, Jugulum, Pectus, Abdomen, Femora ac Crissum*  
ferrugineo alboque varia ex plumis albis ferru-  
ginoso marginatis.


*Caudae medium* nigricans, *latera* ferrugineo-rufescentia.  
*Pedes* nigri.







*Muscivora bicolor*



N:o XLVI.

*MUSCICAPA bicolor*, corpore supra  
cinereo, subtus ochraceo, cauda ex rectricibus  
ochraceis cinereisque.

*Rostrum* nigricans.

*Capitulum*, *Dorsum Colli*, *Humeri*, *Interscapulum* ac *Dorsum* cinerea.


*Tectrices Alares Inferiores* cinerae, margine canescentes.


*Remiges* cinerae.

*Pedes* nigricantes.


*Cauda* longitudine circiter corporis et *Rectricibus* ochraceis cinereisque constans.

Obs. Habitat in Africa Meridionali.





*Muscivora fuliginosa*



N:o XLVII.

*MUSCICAPA fuliginosa*: corpore ex  
ferrugineo et nigricante fuliginoso, Alis cauda-  
que nigricantibus, rostro flavicante.

*Rostrum* pallide flavicans.

*Caput, Collum, Corpus supra ac subtus* nigricantia.

*Alae* nigricant.


*Pedes* nigri.

*Cauda* nigra, corporis mensura et dimidii.


OBS. In Deferto Africano inter rivulum Heuj et Fontem Quam-  
medacka deteximus.







*Larus peregrinus, Mas.*



N:o XLVIII.

*PARUS perigrinus*, Mas: capite, collo dorsoque cinereis, pectore, macula alari uropygio ac rectricibus lateralibus postice coccineis.

*Rostrum* nigrum.

*Lorum* *Maculaque* sub-ocularis nigricant.

*Capitulum*, *Gula*, *Colli dorsum* ac *latera*, *Interscapulum*.  
*Dorsumque* plumbeo-cinerea.

*Rectrices* Sub-Alares fulphureae.

—— *Supra-Alares* atrae, quarum *Aliquot Intermediae* apice coccineo-fulvae.

*Remiges Primariae* Duodecim, harum tres vel quatuor primae fusco-nigrae, margine interiore in medio paululum flavo tinctae.

—— *Primariae reliquae* ac

—— *Secundariae* fere omnes atrae in medio coccineae.

*Juguli pars*, *Pectus*, *Uropygium* coccinea.

*Abdomen Crissumque* leniter flavicantia.

*Pedes* nigri.

*Cauda Rectricibus* Decem nigris, tribus utrinque postice coccineis.

Obs. Character *Motacillae cinnamomeae* (confer. Syft. Nat. Edit. XII. pag. 335. N:o 32.) cum *P. peregr.* nostr. fatis convenit, in variis tamen differt.





*Larus peregrinus, foemina .*



N:o XLIX.

*PARUS perigrinus*, *Femina*: corpore supra cinereo, subtus albo, macula alari aurantia, uropygio et rectricibus lateralibus postice coccineis.

*Rostrum* nigrum.

*Capitulum*, *Colli Dorsum*, *Interscapulum Dorsumque* cinerea.

*Uropygium* anterius flavo-virescens, posterius coccineo-fulvum.

*Gula*, *Jugulum*, *Pectus*, *Abdomen* fordide alba.

*Cristum* flavicans.

*Tectrices Supra-Alares anteriores* nigrae.

———— Inferiores posteriores flavae.

*Remiges Primariae anteriores tres vel quatuor* fuscae.


———— Reliquae fere omnes nigrae, basi fulvo-coccineae, una cum tectricibus posterioribus maculam alarem constituentes.


*Pedes* nigri.

*Cauda* Rectricibus ut in *Mare*, sed quinta utrinque etiam nigra apice oblique coccinea.

Obs. Confer. *Syst. Nat.* pag. 342.







*Larus indicus.*



N:o L.

*PARUS indicus* : gula et jugulo sordide  
albis , pectore abdomine crissoque ferrugineis ,  
corpore supra cinereo , rostro , pedibus , alis cau-  
daque nigro-fuscis.

*Rostrum* fuscum.

*Sinciput* cinereo - nigricans.

*Oculorum regiones* , *Occiput* , *Colli Dorsum* , *Interscapulum*  
*Dorsum* ac *Uropygium* cinerea.

*Gula* ac *Jugulum* sordide albicantia.

*Pectus* , *Abdomen* , *Crissum* ferruginea.

*Tectrices Supra-Alares* nigrae , margine cinerae.

*Remiges* fuliginoso - nigricantes.

*Cauda* supra fusco - nigricans , subtus cinereo - fusca.



















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01203 8972